

# À retenir

Ma scintigraphie myocardique à la Persantine est programmée le ...../...../..... à .....heures.

12 heures avant l'examen, je ne dois pas consommer d'aliments tels que le café, les boissons énergisantes, le thé, le coca-cola, le cacao, le chocolat, le kiwi ou banane.

Je peux déjeuner sans café ni chocolat.

Je dois prendre mes médicaments habituels (sauf... que le médecin m'a contre-indiqué durant.....).

J'apporte la liste complète de mes médicaments.

## Pour les services de Cardiologie et Médecine nucléaire

Site Meuse

Prise de rendez-vous

Médecine nucléaire : 081 72 61 43



Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse  
[www.chrsm.be](http://www.chrsm.be)  
[meuse.chrsm.be](http://meuse.chrsm.be)


CHRSM - site Meuse  
Avenue Albert 1<sup>er</sup>, 185  
5000 Namur  
Tél : +32 (0)81 72 61 11

Suivez l'actualité du CHRSM sur les réseaux sociaux



# Scintigraphie myocardique à la Persantine

Brochure d'information au patient



## Qu'est-ce qu'une scintigraphie myocardique ?

La scintigraphie myocardique est un examen d'imagerie médicale non invasif qui permet d'évaluer l'irrigation sanguine du cœur au moyen d'un produit radioactif faiblement dosé, injecté par voie intraveineuse.

## Préparation

Vous pouvez prendre un déjeuner léger.

Depuis la veille et jusqu'à votre arrivée, **ne pas consommer** d'aliments tels que :

- **Café**
- **Boissons à base de caféine comme les boissons énergisantes**
- **Thé**
- **Coca-cola**
- **Cacao**
- **Chocolat**
- **Kivi ou banane**

## L'examen

Durée : la procédure d'examen dure au moins 2 heures.

## Déroulement de l'examen

### 1. Rendez-vous route 74 au 1<sup>er</sup> étage en Médecine nucléaire

- > Les vignettes seront réalisées
- > Une perfusion sera posée

### 2. Rendez-vous route 48 au 5<sup>ème</sup> étage en Consultation de cardiologie

Réalisation du test à la Persantine par une infirmière sous la supervision d'un cardiologue. Lors de l'injection de la Persantine, vous pourriez ressentir des symptômes tels que : maux de têtes, sensation de chaleurs, oppression ... L'antidote de la persantine vous sera injecté à la fin du test. Le traceur radioactif permettant de réaliser les images sera injecté durant ce test.

**3. Plus ou moins une heure après** le test à la Persantine, vous vous rendez **route 74 au 1<sup>er</sup> étage** en Médecine nucléaire où les images seront effectuées. Durant cette heure d'attente, il vous est demandé de manger. Cela améliore la qualité des images. Retour route 74 à .....h.....

