


L'infiltration sous scopie

Service d'Imagerie médicale

Livret de préparation à votre prochain examen. Toutes les infos utiles avant, pendant et après l'examen.



Une brochure pour vous, votre partenaire et vos proches.

Sur demande de votre médecin, vous allez bénéficier d'une infiltration sous scopie.

Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cet examen. Si tel est le cas, nous ne pourrons effectuer ce geste thérapeutique.

Cette brochure est à votre disposition afin de vous expliquer le déroulement de cet examen.

Nous espérons qu'elle répondra à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, notre équipe se fera un plaisir d'y répondre.

Restant à votre disposition, toute l'équipe vous souhaite un agréable séjour dans le service d'Imagerie médicale.

Sommaire

- Qu'est-ce qu'une infiltration sous scopie ?
- Avant, pendant et après l'examen

Qu'est-ce qu'une infiltration sous scopie ?

L'infiltration sous scopie consiste à **injecter un anti-inflammatoire à base de cortisone** à l'endroit responsable de votre douleur. Elle permettra de la soulager temporairement.

Le geste médical est réalisé en salle de radiologie.

Cette technique utilise des rayons X. Les appareils actuels et la formation du personnel permettent de limiter au maximum votre exposition à ces rayons. Le volume de contraste iodé utilisé ne dépasse pas 2ml. Si vous souffrez d'insuffisance rénale, rassurez-vous, cet examen ne l'aggravera pas.

Bien que l'injection de cortisone puisse révéler un diabète latent ou déséquilibrer un diabète existant, la quantité de cortisone utilisée n'aura pas d'influence sur un (pré)diabète.

L'examen



Combien de temps dure l'examen ?

La durée est de **15 à 20 minutes**, sauf cas particulier.



Qui pratique l'examen ?

L'examen est réalisé par un **radiologue**, assisté d'un technologue.



Où se déroule l'examen ?

L'infiltration sous scopie se réalise dans le service d'Imagerie médicale (1^{er} étage route 73).

Avant l'examen

CONTRE-INDICATIONS

- > La grossesse ou le risque de grossesse ;
- > L'allergie à la cortisone et/ou l'iode.

La prise d'anticoagulants n'est pas une contre-indication.

L'arrivée

Vous arrivez 15 minutes avant l'examen et vous vous présentez à l'accueil du service d'Imagerie médicale avec :

- > Votre carte d'identité ;
- > Votre demande d'examen ;
- > La liste des médicaments que vous prenez ;
- > Le produit à injecter si nécessaire ;
- > Le consentement éclairé.

S'il s'agit d'une infiltration d'un autre médicament que le dépomédrol 40 mg que nous utilisons, **n'oubliez pas de vous le procurer en pharmacie avant de venir.**

Votre médecin prescripteur fera le nécessaire pour vous fournir l'ordonnance.

Pendant l'examen

Pendant l'infiltration, suivez bien les **recommandations du médecin et du technologue**.

Votre coopération est essentielle, elle contribuera à la **rapidité** du geste de ponction et **diminuera les risques de douleur et de complication**. Elle **réduira également le temps d'exposition aux rayons X**.

L'installation

Le technologue vous demandera vos nom, prénom et date de naissance et le motif de votre examen.

Il vous demandera de vous installer sur la table d'examen, la région dégagée.

- Vous serez allongé **sur le ventre ou sur le dos** selon le type d'infiltration ;
- Après la **désinfection cutanée**, le médecin réalisera l'**injection sous contrôle radiologique** ;
- Quand l'infiltration est terminée, le technologue désinfectera le point de ponction et posera un **pansement**.

Après l'examen

Quelles sont les complications ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximale, comporte un risque de complications.

Complications précoces :

- Allergie PCI;
- Malaise vagal;
- Douleurs au point de ponction pendant quelques heures.

Complications tardives rares :

- Infection du point de ponction : fièvre, chaleur, rougeur, gonflement;

Si vous souffrez de complications, prenez contact avec notre service d'imagerie médicale.

Quelles sont les précautions ?

Un repos de minimum de 24 à 48 heures après l'infiltration est conseillé pour une meilleure efficacité de celle-ci. L'amélioration se manifeste dans les 3-4 jours qui suivent l'infiltration.

En cas de douleur, vous pouvez prendre votre **antidouleur habituel**.



CHRSM - site Meuse

Avenue Albert 1^{er}, 185
5000 Namur
Tél. : +32 (0)81 72 61 11

www.chrsm.be

www.chrn.be

Suivez l'actualité du **CHRSM**
sur les réseaux sociaux



Mise à jour: 11 2022
Brochure à destination des patients
du CHRSM - site Meuse

Réalisation: Service Communication
Éditeur responsable: Stéphane Rillaerts
CHRSM - site Meuse
Avenue Albert 1^{er}, 185 - 5000 Namur

Service d'Imagerie médicale

Comment nous contacter ?

081 72 60 50

Fax: 081 72 60 99

Localisation :

1^{er} étage route 73

Résonance magnétique

081 72 60 50

Localisation :

1^{er} étage route 73